(CAT - KUCING) PENYEBAB TERJADINYA ENTERITIS AKUT PADA KUCING

(12 Dec 2022)

PENYEBAB TERJADINYA ENTERITIS AKUT PADA KUCING

PENGERTIAN

Enteritis adalah suatu kondisi medis yang ditandai dengan peradangan pada usushalus yang biasanya disertai diare. enteritis mengacu pada peradangan pada usus kecil, kolitisradang pada usus besar, typhlitis radang pada sekum dan proktitis radang pada rektum. Pada banyak penyakit perubahan melibatkan seluruh usus dan perut dan istilah radang inidigunakan gastroenteritis.

Yang dapat menyebabkan Enteritis kronis antara lain :

• Makanan

Memakan bahan yang telah busuk, benda asing, makan berlebihan atau perubahan pakanmendadak atau intoleran terhadap bahan pakan seperti laktosa, diet lemak tinggi atau bahanaditif makanan

• Agen Infeksi

Seperti Parvovirus, Coronavirus, Rotavirus, Bakterial seperti Salmonella,Clostridium, Campylobacter, Eschericia coli, Bacillus piliformis, Rickettsia yang disebabkan Neorickettsia, Fungi namun lebih sering menyebabkan diare kronis, Parasit seperti Ascaris,Giardia, Koksidia, Ancylostoma, dan Strongyloides.

• Penyebab Lain

Gastroenteritis hemoragis, hipoadrenokortisism, penyakit hepar, pankreas, dan renal.

Pada diare osmotik Dalam lumen bahan makanan tidak terabsorbsi dengan baik. Hal ini bisa terjadi karena mengingesti bahan yang sulit terabsorbsi (serat), malasimilasi bahan makanan, kegagalantransport bahan non elektrolit (glukosa). Bahan-bahan tersebut biasanya mudah

menyerap air juga menyebabkan air dari plasma masuk ke dalam lumen intestinal, sehingga menambah jumlah air di dalam lumen. Diare osmotik ini akan berhenti bila hewan dipuasakan. Hampir semua hewan yang mengalami diare osmotik mengalami penyakit kronis. Pada diare sekretaris cairan dan elektrolit disekresi oleh sel sekretoris. Bahan yang disekresi berupa enterotoksin, hormon gastrointestinal, prostaglandin, stimulasi parasimpatis, serotonin asamempedu, asam lemak hidroksilat, laksatif. Diare sekretoris murni tidak berhenti bila hewan dipuasakan. Pada gejala simtomatik diikuti dengan dehidrasi, depresi, tidak mau bergerak, dan lemah. Frekuensi defekasi lebih dari 6 kali sehari dan umumnya ditemukan bercak darah pada feses.Nah apabila kucing pawrent's mengalami diare seperti diatas dengan langkah awal dipuasakan namun konsisten poop masih diare disarankan untuk pemeriksaan darah agar mengetahui diare tersebut disebabkan oleh parasit, virus, bakteri ataupun yang lainlain serta apabila penanganan terlambat penanganan hingga mukosa terlihat pucat dan dehidrasi parah bisa menyebabkan kematian pada kucing tersebut. Karena pada dasarnya kucing diare membutuhkan penanganan yang cepat dengan memberikan cairan tambahan apabila sudah dehidrasi dan mukosa pucat. Vitamin yang direkomendasikan untuk pencegahan diare dan mengatasi alergi pakan pawrent's bisa memberikan KIS-KIS CAT PASTILLES ODOURLESS karena vitamin ini mengandung karbon aktif.

KIS-KIS CAT PASTILLES ODOURLESS

Keunggulan:

• Mengandung karbon aktif

• Mengandung ekstrak alami untuk mengurangi bau kotoran dan urin

• Menghilangkan bau menyengat pada kotoran dan urin

• Mencegah diare atau pup lembek karena radang dan alergi makanan

• Menyerap dan mengeluarkan racun dari tubuh

• Mengatasi alergi pakan

• Mengurangi perut kembung

• Dapat meningkatkan nafsu makan

• Memiliki rasa lezat dan tidak pahit sehingga dapat dimakan langsung.