

(CAT - KUCING) BAHAYA KONSTIPASI PADA KUCING

(26 Dec 2022)

BAHAYA KONSTIPASI PADA KUCING

PENGERTIAN

Konstipasi didefinisikan sebagai berkurangnya, hilangnya, atau kesulitan dalam melakukan defekasi. Dalam beberapa kasus konstipasi, ditemukan kucing defekasi di luar litter box. Hal ini disebabkan ketika kucing defekasi memulai pada litter box tetapi sedikit atau tidak ada yang keluar sampai mereka mulai pergi atau keluar, namun aktivitas fisik (berjalan) mendorong beberapa feses jatuh ke tanah. Seringkali kasus konstipasi dapat berujung pada kasus lain, yaitu megakolon. Megakolon merupakan kelainan yang dikarakterisasi dengan konstipasi berulang atau obstipasi yang berhubungan dengan dilatasi dan hipomotilitas kolon. Pada kasus konstipasi lebih sering terjadi jika dibandingkan dengan kasus pencernaan lainnya, seperti diare. Kasus konstipasi cukup sulit dideteksi pada fase awal sehingga kasus yang ditemukan umumnya telah menyebabkan megakolon dan membutuhkan penanganan berupa tindakan operasi.

Kucing mengalami kesulitan defekasi selama satu bulan dan bagian perutnya tampak membesar. Sebelumnya, kucing melakukan defekasi satu sampai dua kali dalam satu hari atau dalam kurun waktu 24 jam. Kucing terlihat sulit mengejan dan mengalami kesulitan dalam melakukan defekasi. Kucing juga menghabiskan waktu di litter box lebih lama untuk defekasi dibandingkan biasanya. Feses yang dikeluarkan oleh kucing memiliki konsistensi keras dan kering serta ditemukan feses di luar litter box-nya. Nafsu makan kucing masih baik dengan pakan kering/dry food yang diberikan. Pemberian minum dilakukan secara ad libitum.

Namun, volume air yang dikonsumsi kucing hanya sedikit. Kucing jarang beraktivitas fisik dan lebih sering berbaring. Pergerakan fisik hanya terjadi apabila ada interaksi khusus dengan pemilik (dalam bentuk panggilan atau komunikasi verbal) dan ketika kucing hendak makan. Pengambilan gambar X-Ray dilakukan dengan posisi ventrodorsal dan lateral. Dari hasil gambar X-Ray terlihat adanya penumpukan feses dan terdapat feses yang terlihat berwarna lebih pekat dan putih (radiopaque) dibandingkan yang lain pada bagian kolon serta adanya akumulasi gas yang menyebabkan posisi hati terdesak. Nah pawrens't penyebab konstipasi yang dialami oleh kucing kasus adalah dehidrasi karena kucing jarang minum dan pakan yang diberikan berupa pakan kering (dry food). Kucing yang diberikan pakan kering cenderung mengalami konstipasi ringan dikarenakan pakan

kering mengandung serat kasar yang tidak dapat dicerna dan cenderung membentuk bulk yang sulit dicerna dan berpotensi menghambat saluran pencernaan karena feses yang dihasilkan terlalu kering. Kamu bisa memberikan pakan basah seperti Tomi CatCanned Food With Salmon karena pakan ini terdapat kandungan air dan cocok untuk kucing yang sedang masa recovery.

TOMI CAT CANNED FOOD WITH SALMON

Keunggulan :

Pakan berbentuk pate yang sangat lembut

Tanpa tambahan pewarna, penyedap rasa, dan pengawet

Mudah dicerna oleh kucing

Tinggi protein dan serat untuk kebutuhan nutrisi

Memiliki aroma dan rasa lezat

Meningkatkan nafsu makan kucing

Cocok untuk kucing yang sedang masa penyembuhan (recovery) dan nafsu makan turun

Baik untuk masa pertumbuhan kitten ataupun kitten yang sedang tumbuh gigi

Direkomendasikan untuk kitten yang baru belajar makan.