

FELINE LOWER URINARY TRACT DISEASE

(14 Jun 2017)

Feline Lower Urinary Tract Disease

Feline Lower Urinary Tract Disease (FLUTD) disebut juga dengan Feline Urologic Syndrome (FUS) dan dikenal juga dengan Feline Idiopathic Cystitis. Idiopathic berarti adalah penyebab penyakitnya belum dapat diketahui. Feline Idiopathic Cystitis mirip dengan Interstitial Cystitis pada manusia. Penyakit ini mengganggu berlangsungnya sistem perkemihan dalam tubuh kucing, khususnya sistem perkemihan bagian bawah seperti kandung kemih dan urethra. Lapisan yang melapisi kandung kemih menjadi terkikis dan hilang sehingga terjadi peradangan secara terus menerus, membuat kandung kemih menjadi lebih tebal, bahkan terjadi perdarahan. Faktor yang menjadi penyebab timbulnya FLUTD pun bermacam-macam, seringnya karena tersumbatnya saluran kemih. Namun diperkirakan stres menjadi peranan penting dalam timbulnya FLUTD.

Faktor Penyebab Timbulnya FLUTD

Batu pada kandung kemih

Infeksi kandung kemih

Interstitial Cystitis (peradangan kandung kemih)

Obstruksi uretra - adanya batu yang menyumbat saluran uretra

Stres

Gejala FLUTD pada Kucing

Sulit buang air kecil

Sering terlihat berusaha buang air kecil tetapi urin tidak keluar

Sakit ketika buang air

Urin berdarah (hematuria)
Kurang nafsu makan
Agresif
Buang air diluar kotak pasir
Sering menjilati area genitalnya

Perawatan Kucing FLUTD

1. Mengurangi Stress

Usahakan menjalankan rutinitas normal
Jangan menubah makannya dan beri makanan di tempat yang tidak ramai
Perkaya instingnya dengan berbagai mainan dan papan skratcher
Luangkan cukup waktu bersamanya untuk bermain bahkan bersantai untuk membuat kucing merasa nyaman & aman
Letakkan kotak pasir berukuran besar pada tempat yang sepi
Hindari konflik dengan hewan atau kucing lain. Jika terjadi konflik, Anda dapat memisahkan tempat mereka, mulai dari tempat makan dan minum, kotak pasir, sampai ruangan
Berikan panjatan dengan posisi ventrikal untuknya
Baca juga : Stress pada Kucing & Cara Mengatasinya

2. Menghilangkan Rasa Sakit

Berikan obat penghilang rasa sakit yang telah diberikan dokter untuk meredakan sakitnya
Dokter hewan mungkin akan meresepkan pereda nyeri bersama dengan obat penenang

3. Minum

Berikan air bersih yang tersedia sepanjang waktu dan tempatkan pada tempat yang mudah dijangkau

Berikan sedikit kaldu atau air dari ikan tuna pada air minumnya agar kucing minum lebih banyak
Berikan makanan basah dalam kaleng untuk memberikannya lebih banyak asupan air dalam tubuh kucing
Dapat juga dengan menambah air atau kaldu pada dry food

4. Kotak Pasir

Selalu jaga kotak pasir agar tetap bersih dan tersedia

5. Berikan Medicated Cat Food PRO-VET STRUVITE untuk mengatasi masalah endapan pada saluran perkemihan

PRO-VET STRUVITE 3 KG

PROTEIN: 25% & FAT: 20%

(DIREKOMENDASIKAN UNTUK KUCING DEWASA / UNTUK PENGOBATAN / MEDICATED)

Kaya antioksidan alami . Mengurangi risiko kanker dan gangguan ginjal

Rendah fosfor ("Loweres") mengurangi resiko "gagal ginjal" .

Kaya serat dengan viskositas tinggi (FHV) Mengurangi resiko diabetes mellitus dan pembentukan hairball . Merangsang motilitas usus dan kemajuan kotoran konsistensi .

Kaya serat dengan viskositas rendah (FLV) Merangsang motilitas usus dan mengontrol pembentukan hairball .

Ekstrak Yucca/Oddour Control Menghilangkan pembentukan bau oleh kotoran

Ditambahkan prebiotik :mannan - oligosakarida

fructo - oligosakarida Mendukung pertumbuhan bakteri menguntungkan dalam usus . Melindungi usus terhadap bakteri patogen

Kontrol pH kemih

EPA + DHA

Campuran antioksidan alami

L - carnitine / Prebiotik (MOS + FOS)

Pengobatan Kucing FLUTD

1. Obstruksi Uretra

Menghilangkan obstruksi melalui kateter

Perawatan suportif dengan cairan intravena

Pemantauan fungsi ginjal & kadar elektrolit

2. Infeksi Kandung Kemih

Pemberian antibiotik

3. Batu pada Kandung Kemih

Operasi pengangkatan batu pada kandung kemih

Diet terapeutik yang disarankan dokter hewan baik pra atau pasca operasi

Semoga bermanfaat.