

SPOROTRICHOSIS PADA KUCING

(06 Oct 2017)

Sporotrichosis pada Kucing

Sporotrichosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh fungus (jamur) *Sporothrix schenckii*. Sporotrichosis biasanya menyerang kulit dan sistem pernafasan, namun penyakit ini juga dapat menyerang tulang dan otak. Penyakit ini disebabkan oleh spora jamur yang masuk ke dalam tubuh melalui luka abrasi atau melalui udara yang masuk ke saluran pernafasan. Kontak dengan luka yang terkontaminasi spora *Sporothrix* juga dapat menularkan penyakit Sporotrichosis. Kucing yang terkena Sporotrichosis akan cenderung menularkannya pada kucing lain atau pun pada manusia.

Spora *Sporothrix* biasanya berasal dari tanah dan tumbuh-tumbuhan. Spora ini juga dapat dibawa oleh hewan yang terinfeksi. Kucing merupakan hewan yang mudah sekali terinfeksi *Sporothrix* karena sangat sering ditemukan di lingkungan sekitar. Terlebih waktu birahi pada kucing membuat kucing suka berkeliaran sehingga rentan terjangkit Sporotrichosis. Oleh sebab itu, untuk menghindari terjadinya penularan penyakit ini baiknya kucing dipelihara di dalam rumah. Sterilisasi yang dilakukan pada kucing juga dapat mencegah kucing keluar rumah sehingga dapat menghindari kontaminasi [enyakit ini.

Gejala Sporotrichosis pada kulit

Terdapat luka-luka, seringkali pada wajah dan hidung. Luka juga bisa terdapat pada kaki dan ekor. Awalnya ditandai dengan pembengkakan pada kulit, diikuti dengan timbulnya luka, kemudian bernanah.

Luka yang ada tidak kunjung sembuh.

Luka tidak bereaksi dengan antibiotik. *Sporothrix* merupakan jenis jamur sehingga tidak akan bereaksi terhadap antibiotik.

Pembengkakan pada kelenjar limfa

Dapat disertai dengan demam, nafsu makan menurun atau tidak mau makan sama sekali, dan lemah

Gejala Sporotrichosis yang menyerang sistem pernafasan biasanya ditandai dengan gangguan pernafasan seperti pneumonia.

Penanganan Sporotrichosis

Apabila Anda mendapati kucing Anda luka-luka pada bagian yang dicurigai terkena Sporotrichosis, segera bawa ke dokter hewan. Hindari menyentuh bagian yang terluka kecuali menggunakan sarung tangan

Dokter hewan akan melakukan tes darah dan mengambil sampel luka untuk diperiksa di mikroskop

Kucing akan dikarantina sehingga infeksi pada hewan lain atau manusia dapat dicegah

Dokter hewan akan memberikan obat anti-fungal dan obat lainnya dengan dosis yang sesuai

Tetap memberikan asupan makanan yang baik pada kucing yang mengalami kehilangan nafsu makan. Berikan makanan yang beraroma kuat untuk memancing nafsu makannya. Anda dapat memberikan Kis-Kis Canned Varian yang lembut dan mudah dicerna oleh kucing

Berikan juga Kis-Kis Pastils MultiVit untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya

KIS-KIS CANNED SALMON

KIS-KIS CANNED DUCK

KIS-KIS CANNED LIVER

KIS-KIS CANNED LAMB

KIS-KIS CANNED RABBIT

KIS-KIS CANNED TROUT

KIS-KIS CANNED TUNA

KIS-KIS CANNED TURKEY

CAT VITAMIN KIS-KIS PASTILS MULTIVIT

PROTEIN : 10,4% FAT : 2,6%

VITAMIN UNTUK KUCING

Direkomendasikan untuk semua jenis dan usia kucing

Berfungsi untuk pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan

Pencegahan Sporotrichosis

Menghindari kucing bermain di luar rumah seperti berguling pada tanah atau bermain di semak-semak

Mencegah kucing berinteraksi dengan kucing liar

Segera mengobati luka yang terdapat pada tubuh kucing

Hindari perkelahi n antar kucing dengan sterilisasi kucing

Semoga bermanfaat.